

## Übersicht: Tröpfchenisolation

Z.B.: Influenza/Parainfluenza, Meningokokken (Meningitis, Pneumonie, Bakteriämie), Mumps, Röteln

### Organisation

Meldung	▪ Spitalhygiene
Zimmer	▪ Einzelzimmer oder Isolierzone (mindestens 1 Meter Abstand)
Markierung	▪ Türschild Tröpfchenisolation, gelb
Im Zimmer	▪ Chirurgische Masken, Händedesinfektionsmittel

### Personal Massnahmen: Standardmassnahmen

Chirurgische Maske	▪ Bei Patientenkontakt < 1 m
Händedesinfektion	▪ Gemäss den Indikationen zur Händedesinfektion
Handschuhe	▪ Bei Kontakt mit Körpersekret/-flüssigkeit der Hände
Schutzbrille	▪ Bei Kontakt mit Körpersekret/-flüssigkeit des Gesichts
Überschürze	▪ Bei Kontakt mit Körpersekret/-flüssigkeit des Körpers/Arme

### Patient ausserhalb Patientenzimmer/Untersuchungen

Aufenthalt ausserhalb Patientenzimmer	▪ Kein Aufenthalt auf Station / Spitalräumlichkeiten ▪ Aufenthalt im Freien möglich ▪ Pat. trägt chirurg. Maske auf dem Weg ins Freie/innerhalb Gebäude
Untersuchungen/Eingriffe ausserhalb Patientenzimmer	▪ Information Zielabteilung/Untersucher/Transportdienst ▪ Pat. trägt chirurgische Maske

### Besucher

Besucher	▪ Chirurg. Maske, Instruktion durch Pflege über korrektes Anziehen/Tragen ▪ Händedesinfektion oder Händewaschen vor Verlassen des Zimmers
----------	--

### Reinigung / Desinfektion / Entsorgung

Flächen /Geräte	▪ Gezielte Flächendesinfektion
Instrumente	▪ Reguläre Aufbereitungsabläufe
Abfall/Wäsche/Geschirr	▪ Übliche Arbeitsabläufe
Tgl. Zimmerreinigung	▪ Übliche Arbeitsabläufe

### Aufhebung Isolation

Entisolation	▪ Gemäss Richtlinie „Tröpfchenisolation“
Zimmerreinigung	▪ Es gelten die üblichen Arbeitsabläufe
Meldung	▪ Spitalhygiene